

かぶ かくだい そ し オミクロン株 拡大阻止!!

かぶ とくちょう
オミクロン株の特徴

つよ かんせんりょく
強い感染力

はや はつびょう
早く発病

2かい せつしゆすみ
ワクチン2回の接種済
かんせん かのうせい
でも感染の可能性

ふつうの風邪よりも症状が強く、何日か通勤等が不可能に。

でも、基本的な感染防止対策により防ぐことができます。



かいめ せつしゆ けんとう ねが
3回目のワクチン接種の検討をお願いします

ワクチンの種類よりも、できるだけ早く接種することが重要です!

どちらのワクチンで3回目を接種しても、抵抗力(抗体価)は大幅上昇。

3回目接種後について		ファイザー製	モデルナ製
抗体価 (接種から28日後)		54.1倍	67.9倍
副反応 発生割合	38℃以上の発熱	21.4%	49.2%
	全身倦怠感	69.1%	78.0%
	頭痛	55.0%	69.6%

※副反応は接種1日後の発現が最も高く、3日後にはほぼ消失します (厚労省公表データより)

はる ぎょうじ ちゅうい
春の行事にご注意ください

お花見、イースターなどに伴う大人数・長時間のパーティや混雑した

場所への外出など、感染リスクの高い行動は避けてください。