

# Omicron Variant Expansion Prevention!!

**Mga katangian ng Omicron strain**


Malakas  
Makahawa

Magkakasakit  
kaagad

May  
posibilidad na  
mahawa kahit  
na may 2nd  
bakuna

Ang mga sintomas ay mas malakas kumpara sa karaniwang sipon, na ginagawang imposibleng magtrabaho ng ilang araw, atbp.

Gayunpaman, mapipigilan ito ng Basic Infection Control measures.



## Pag-isipan kunin ang 3<sup>rd</sup> o Booster shot

Mas mahalagang magpabakuna sa lalong madaling panahon kaysa sa uri ng bakuna!

Anuman ang ginamit na bakuna para sa 3<sup>rd</sup> dose, ang resistensya (antibody level) ay tumataas nang malaki.

Pagkatapos ng 3 <sup>rd</sup> pagbabakuna		Gawa ng Pfizer	Gawa ng Moderna
Antibody Level (28 days pagkatapos magpabakuna)		54.1 times	67.9 times
Side Effect Rate ng bakuna	Lagnat na 38 °C o higher	21.4%	49.2%
	Sobrang pagod ng katawan	69.1%	78.0%
	Headache	55.0%	69.6%

※Mataas ang posibilidad lumitaw ng side effects 1day pagkatapos magpabakuna at halos nawawala ito pagkatapos ng 3 araw (ayon ito sa data na inilabas ng Ministry of Health, Labor and Welfare).

## Mag-ingat sa mga Spring Events

Iwasan ang mga aktibidad na may mataas na peligro ng impeksyon, tulad ng Easter party, paglabas sa mataong lugar, cherry blossom viewing at iba pa.